

media Giesbr.

Fundorte: Barbariga, Quarnero, Cigale auf Lussin, Selve,
Zara, Sebenico (S. Vito), Lucietta.

conifera Giesbr.

Fundorte: Lucietta, Ragusa.

subtilis Giesbr.

Fundort: Selve.

Fam. *Corycaeidae*.Gen. *Sapphirina* Thompson.*angusta* Dana.

Fundort: Ragusa (Steuer, 1907).

Bisher gefunden: Triest, Quarnero, an mehreren Stellen
der südlichen Adria (Steuer, 1907).

lactens Giesbr.

Fundorte: Selve, Ragusa.

nigromaculata Cls.

Fundorte: Barbariga, Quarnero, Cigale auf Lussin, Selve,
Zara, Lucietta, Ragusa.

Bisher bekannt: Triest, Rovigno, Quarnero, zahlreiche
Stellen der südlichen Adria (Steuer, 1907).

maculosa Giesbr.

Fundorte: Selve, Ragusa.

Bisher bekannt: Mehrere Stellen der südlichen Adria
von etwa 43° n. Br. an (Steuer, 1907).

opalina Dana.

Fundort: Ragusa.

Bisher bekannt: wenige Stellen der südlichen Adria
von etwa 43° n. Br. an (Steuer, 1907).

metallina Dana.

Fundort: Ragusa.

Bisher bekannt: an wenigen Stellen der südlichen Adria,
südlich von 43° n. Br. an (Steuer, 1907).