

Tafelerklärung.

- Fig. 1. *H. perforatum* L. Querschnitt durch eine Hauptleiste des Stengels.
 Fig. 2. *H. perforatum* L. Querschnitt durch den basalen Teil des Stengels.
 Fig. 3. *H. maculatum* Cr. subsp. *erosum* (Schinz) m. Querschnitt des Blattes mit dunkler Drüse.
 Fig. 4. *H. perforatum* L. Querschnitt durch ein Kronblatt; ein dunkler Drüsenstrich getroffen.
 Fig. 5. *H. maculatum* Cr. subsp. *erosum* (Schinz) m. Querschnitt durch die Wand des Fruchtknotens.
 Fig. 6. *H. perforatum* L. Sklerenchymfaserschicht an der Innenseite der Fruchtwand im Flächenschnitt.
 Fig. 7. *H. acutum* Mnch. Querschnitt durch eine Scheidewand der Frucht.

ap = assimilierendes Parenchym; *c* = Cambium; *ep* = Epidermis, *h* = Schutzhülle; *l* = Leptom; *lb* = Libriform; *lu* = Lumen; *mes* = Mesophyll; *mst* = Markstrahl; *oep* = obere Epidermis; *p* = Palisadengewebe; *pe* = Periderm; *rp* = Rindenparenchym; *sch* = Schwammparenchym; *s* = Sekretzellen; *sf* = Sklerenchymfaser; *sk* = Sekretkanal; *u ep* = untere Epidermis.