

Exemplare (bis 1·5 mm Schirmhöhe) festgestellt, daß sie vier einfache Mundgriffel und acht einfache Tentakel aufweisen. In diesem Material fanden sich nur einige wenige Jugendformen von zirka 1 mm Schirmhöhe mit Knospen und acht Tentakeln. Ein ähnliches *Dysmorphosa*-Stadium macht jedoch auch *Lizzia blondina* Forbes durch, welche hier reichlich vertreten ist, so daß ihre Jugendstadien leicht für Exemplare von *Podocoryne minuta* gehalten werden können. Ich glaube jedoch, fünf Medusen aus dem Fang bei der Insel Dolfín als Exemplare von *Podocoryne minuta* betrachten zu können, weil sie bei zirka 1 mm Schirmhöhe keine Anlage eines zweiten Fadens an den Bulben zeigen, während auch viel kleinere Exemplare von *Lizzia blondina* konstant einen oder mehrere perradiale Tentakelbündel aufweisen.

Fundort 1911: Vor der Insel Dolfín, 78 m.

Genus *Bougainvillia* Lesson 1836.

Bougainvillia autumnalis Hartlaub 1897.

Zahlreiche Exemplare (20) mit höchstens vier Fäden in jedem Tentakelbündel und vier Ocellen; Mundgriffel bis dreimal dichotom verzweigt. Die meisten Exemplare auf einem jüngeren Entwicklungsstadium, doch viele darunter mit reifen Gonaden.

Fundorte 1911: SW Gruiza, 104 m; Skarda-Isto, 87 m; P. Bonaster, 90 m; P. Velibog, 80 m; vor der Insel Dolfín, 78 m; Kanal von Lussin, 70 m.

Genus *Lizzia* Forbes 1848.

Lizzia blondina Forbes 1848.

- » » Haeckel 1879.
- » » Browne 1895, 1896, 1896/97, 1900, 1905.
- » » Hartlaub 1911.
- » *claparèdii* Haeckel 1879.

(Taf. I, Fig. 6.)

Schirm halbkugelig, mit flachem, rundlichem Scheitelaufsatz, zirka ebensobreit als hoch; Magenstiel kurz, konisch,