

Fam. Limnaeidae.

17. *Limnaea saharica* P. Fischer. — Fischer, in Dybowski, N. Arch. Miss. Scient., I, 1891, p. 363 mit Fig.

Fundort: El Khreider (25. Juli 1910).

Die vorliegenden Exemplare sind nach Pallary's Bestimmung als var. *minor* zu bezeichnen.

Fam. Melaniidae.

18. *Melania tuberculata* Müll. — Westerlund, Binnenconch., VI, p. 103.

In Anzahl von Figig (30. Juli 1910) vorliegend.

19. *Melanopsis buccinoidea* Oliv. — Westerlund, Binnenconch., VI, p. 116.

In Anzahl von El Khreider (25. Juli 1910) vorliegend.

20. *Melanopsis maresi* Bgt. — Westerlund, Binnenconch VI, p. 129.

Fundort: Figig (30. Juli 1910).

Herr P. Pallary, dem ich die Bestimmung verdanke, macht mich aufmerksam, daß diese Art, welche in der Paléont. Algér., 1862 (p. 106, t. 6, f. 1 bis 4), und in der Malac. Alg., II, 1864 (p. 265, t. 16, f. 21 bis 24) beschrieben und abgebildet ist, in der Umgebung von Ain Sefra (dem Originalfundorte) nicht lebend zu finden ist. Um so interessanter sind nun die von Prof. Werner frisch gesammelten, in Alkohol konservierten Exemplare von der südlicher gelegenen Lokalität.

21. *Melanopsis subscalaris* Bgt. — Westerlund, Binnenconch., VI, p. 127.

In Anzahl von Perrégeaux (Wassergraben, 22. Juli 1910).