

gehören die mehrmals für die algerische Sahara erwähnten¹ Exemplare von *Buthus citrinus* (Hem. et Ehr.) zu dieser *Prionurus*-Form.

6. *Buthus (Buthacus) leptochelys arenicola* (E. Simon);

diese Art ist mehrmals in den Gegenden von Biscra in der algerischen Sahara gefunden worden.² Kraepelin (l. c., p. 266) erwähnt dieselbe Art für die »région des Chotts«, E. Simon (op. cit., p. 52) auch für Bou-Saada und Debila.

7. *Buthus (Hottentotta) Franzweneri* n. sp.;

nach der Ausbeute von Herrn Dr. Franz Werner in der westalgerischen Sahara.

8. *Scorpio maurus maurus* (L.),

9. *Scorpio maurus tuncetanus* Bir.;

vermutlich nur im östlichen Grenzgebiet (Lambesa).³

10. *Euscorpius algericus* (C. Koch);

er kommt nach M. Wagner (Reisen in der Regenschaft Algier, vol. 3, p. 216) »zwischen dem Cap Matifu und dem Städtchen Dellys östlich von Algier« auch bei Bona vor.

Pocock⁴ erwähnt auch *Buthus (Buthus) quinquestriatus* (Hem. et Ehr.), doch ist dies ohne Zweifel ein Irrtum. In den Sandwüsten der algerischen Sahara werden vermutlich auch einige wenig bekannte tunesische Arten, z. B. *Buthiscus bicalcaratus* Bir. und *B. (Buthacus) Spatzi* Bir.⁵ vorgefunden werden.

¹ K. Kraepelin, Bul. Mus. d'hist. natur. Paris, VII (1907), p. 266; E. Simon, Bull. Soc. entomol. d'Egypte (1910).

² R. Pocock, Pr. zool. Soc. London (1892), p. 25; E. Simon, Explor. de la Tunisie, p. 52.

³ Vgl. A. Birula, Horae entom. Ross., XXXIX (1910), p. 115.

⁴ R. Pocock, Ann. and Mag. Nat. Hist., Vol. VIII (6. Ser.), (1891), p. 242.

⁵ A. Birula, Zoolog. Anz. (1905), p. 621; (1911), p. 137.