

bekannten Daten sind viel zu unvollständig, um darüber ein Urtheil fällen zu können.

Buteo minutus Natterer.

B. fronte alba, capite, corpore alisque supra brunneis, in capite et praesertim in nucha plumarum parte basali alba et ochracea passim conspicua, tectricibus alarum anguste albido limbatis, genis et colli lateribus ochraceo-albis plumis macula subterminali brunnea, gastraeo reliquo, tectricibus alarum inferioribus et tibiarum plumis albis ochraceo lavatis, remigum pognoniis externis nigrescentibus, internis brunneis vittis transversalibus obscurioribus, anteriorum basi et reliquarum margine interno albis, remigum anteriorum parte apicali nigrescente, caudae rectricibus supra brunneis, exceptis 4 mediis, basi pogonii interni albis, fasciis transversalibus obscurioribus circa 5'' latis 5—8, subtus albidis fasciis cinereo-brunneis, rostro (in specimine exsiccato) nigro, basi pallida, cera pallida, pedibus flavescentibus. Longit. 18'', alae 1', caudae 6½'', rostri a rictu 15'', tars. 2'' 3''.

Avis jun.?: Praecedenti similis sed genis et lateribus colli dorso concoloribus, tectricibus alarum superioribus pallide haud marginatis, jugulo interdum striis longitudinalibus brunneis.

Var. obscura?: Corpore toto obscure-brunneo, plumarum basi alba hinc inde conspicua, alis caudaque ut in praecedentibus.

Buteo minutus Natterer Catal. Bras. Nr. 773.

Habit. Brasilia, Cayenne.

Unsere Sammlung besitzt von dieser Art ein junges Exemplar aus Cayenne, welches von Becœur unter dem Namen *Buse à tête et dos noir* gekauft wurde; ferner von Natterer aus Brasilien eingeschickt ein junges, am ganzen Körper dunkles Weibchen, und einen jungen Vogel; letzterer aus der Sammlung des Herrn Oberlieutenant Varnhagen.

Laucopternis polionotus (Gray). — Bonap. Consp. I, 19. — Idem in Rev. de Zool. 1854, 533.