

Hab. in *Aethiopiae terra Fassoglu* (Boriani). — Species *L. rivulari* (Aneilemati rivulari Rich. tentam. fl. abyssin. p. 342) et *lanceolato* (Aneilem. lanceolato Benth. in Hook. Niger Fl. p. 546) proxima.

Vallisneria aethiopica. (Hydrocharideae.)

Folia nonnisi 2— $1\frac{1}{2}$ pollicaria, linguaeformia, basi manifestissime attenuata, apice modo rotundata, modo obtusa v. acutiuscula, nunc jam supra basim, nunc saltem supra medium crebre denticulata, obsoletissime multinervia, striolis fusciscentibus multipunctata, venulis transversis nullis. Flores masculi Fl. faemineorum spatha cuneato-linearis, laxiuscula (3—2 lin. lg.), ore obtusissimo bilobo. Perigonium spatha dimidio v. triente longius, lobis ovatis obtusissimis. Stigmata ovalia, apice acute bidentata.

Hab. in *Nilo albo ad insulam Mahabali, in territorio Aethiopum „Schiluk“*, ubi frequentissimam legit, mense Aprili 1837, cl. Dr. Kotschy.

Cadalvena gen. nov.¹⁾

(Ord. Zingiberaceae; Sect. II. Zingibera.)

Calyx tubulosus, hinc fissus, apice bidentatus. Corollae tubus elongatus filiformis, limbi, tubo longioris, laciniae lineari-oblongae, aequales, postica erecta. Stamina tria (petala auct. interiora) petaloidea, speciosa, binis posticis erectis, late ellipticis, acutis; antico (labello) majore late abcordato, adscendenti-deflexo, sinu lobisque acutis. Filamentum breve, canaliculatum, connectivo complanato, supra antheram aequilatam, linearem, bilocularem, basi apiceque muticam, in lacinulam canaliculatam, apice bidentatam producto. Germen ovale inferum, solo apice biloculare, reliqua parte faretum, loculis obverse triangularibus, vertice depressis. Ovula in loculis solitaria, e basi anguli centralis erecta, anatropa, loculos implentia, rhaphe crassa. Stylus filiformis, inter antherae loculos transiens, parum ultra connec-

¹⁾ Genus dicatum memoriae peregrinatoris Ed. de Cadalvène, auctori soperis: *L'Egypte et la Nubie*; Parisiis edit. anno 1836.