

Entfernung der Anale von der Spitze des Unterkiefers 9" 11"

Kopflänge 3" 4½"

Kopfhöhe 1" 6"

Länge des ovalen Auges nahezu 4"

Schnauzenlänge nicht ganz 8"

### 8. Art *Strabo nigrofasciatus* Kn. Steind.

(*Nematocentris splendida* Peters.)

Bei Männchen sind die letzten Strahlen der zweiten Dorsale und der Anale, ferner die Ventralen und die mittleren Strahlen der ersten Dorsale nicht unbedeutend länger als bei Weibchen. Bei Exemplaren von 3" 7" in der Totallänge beträgt die Körperhöhe 14½", die Kopflänge 9". Über die basale Hälfte der zweiten Rückenflosse und der Anale laufen 2—3 Reihen dunkel purpurrother Flecken, der übrige Theil eben dieser Flossen, so wie die ganze erste Dorsale zeigt hell carminrothe, sehr schmale Querstreifen. Die Spitzen beider Dorsalen und der äußere Strahl der Ventrals sind schwärzlich violett, die vier inneren Strahlen der Ventrals und die ganze Schwanzflosse schmutzig rothviolett. Unter der silbergrau eingefassten schwärzlichen oder nur einfarbig silbergrauen Längsbinde, welche über die fünfte Längsschuppenreihe des Rumpfes zieht, liegen häufig noch bei älteren Exemplaren schmalere und zugleich schwächer vortretende schwarzgraue Längsbinden (zwischen je zwei aufeinander folgenden Längsschuppenreihen), welche in der vorderen Längenhälfte des Rumpfes sich zuweilen in runde Flecken auflösen. Der mittlere Theil der in der untern Körperhälfte liegenden Schuppen zeigt lebhaften Silberglanz oder einen Stich ins Rosenrothe. Stirne und Schnauze sind schuppenlos, zwischen dem Auge und der ungezähnten Vorderleiste liegt eine Reihe von Schuppen, ebenso an der Basis der Anale.

1. D. 1/4—5; 2. D. 1/10—11; A. 1/18; V. 1/5; P. 1/12;

L. lat. 32—33; L. transv. 12½—13½.