

mit Binden feiner Spitzzähne, Rumpf klein und cycloid beschuppt.
Von Pinang, Nr. 6353.

19. *Stichaens enneagrammus* nov. sp.

D. 41; A. 33—34; V. 5. 5.

Höhe nahezu $\frac{1}{7}$ der Totallänge, Kopf $4\frac{1}{3}$ mal in letzterer, die Bauchflossen vereinigt aber ohne Trichterhaut und ohne Stachel, eine mediane Laterallinie vor der Dorsale, 3 längs der Seiten und eine vierte jederseits am Bauche bis zum Anus. Von der Decastris-Bai, Nr. 1401. c.

20. *Urocentrus pictus* nov. gen. et sp.

D. 95; A. $1\frac{1}{40}$; V. $1\frac{1}{2}$.

Kopflänge nahezu $\frac{1}{10}$ der totalen, Mundspalte sehr schief, Spitzzähne in einfacher Reihe in beiden Kiefern und am Vomer, Kiemenspalte mäßig weit, die etwas vor den Pectoralen stehenden Ventralen klein, vereinigt mit einem spitzen steifen Stachel. Grundfarbe hellgelblich mit 2 Längsreihen großer dunkelbrauner Flecken. Von Singapore, Nr. 5590.

21. *Zoarces elongatus* nov. sp.

D. 80/12/22; A. ultra 90; C. 11.

Höhe $11\frac{1}{2}$ in der Total- und 2mal in der Kopflänge. Von der Decastris-Bai, Nr. 1402.

Zur Fam. *Teuthididae*:

22. *Teuthis oligosticta* nov. sp.

Höhe $3\frac{1}{2}$ mal in der Totallänge, jederseits 14 dreispitzige Zähne im Zwischenkiefer, Caudale sehr tief eingeschnitten, spitzlappig; auf graulicher Grundfarbe, nur unterhalb der Seitenlinie einige runde schwarze Punkte. Von Kanathia, Viti-Insel, Nr. 5909.

Zur Fam. *Pomacentridae*:

23. *Glyphidodon hemimelas* nov. sp.

D. 13/13; A. 2/12; Squ. $\frac{17+10}{8}$.

Bis zu Ende der stacheligen Dorsale olivenbraun, Hinterrumpf, 2. Dorsale, Anale, Caudale und Ventrals fast schwarz, längs des Suborbitalringes ein bläulicher Strich, ein zweiter am Mundwinkel, am oberen Winkel des Deckels ein großer gelblichweißer Fleck. Von Candavu, Nr. 5913. b.