

Kritische Durchsicht der Ordnung der Flatterthiere oder Handflügler (Chiroptera).

Familie der Kammnasen (Rhinolophi).

II. Abtheilung.

Von dem w. M. Dr. Leop. Jos. Fitzinger.

4. Gatt.: Grubenkammnase (*Ariteus*).

Der hintere Nasenansatz besteht aus einem einfachen lanzenförmigen Blatte. Der mittlere Nasenansatz ist sattelähnlich und wird durch ein aufgerichtetes Längsblatt gebildet. Die Flügel reichen bis auf das Schienbein? Die Schenkelflughaut ist sehr schmal und am Steiße unterbrochen. Der Schwanz fehlt. Die Zehen der Hinterfüße sind dreigliederig, mit Ausnahme der zweigliederigen Außenzehe?

Zahnformel: Unbekannt.

1. Die gelbliche Grubenkammnase (*Ariteus flavescens*).

A. prosthemate anteriore inter nares fossa profunda magna excavato, posteriore lanceolato errecto, postice simplici, antice rotundato; auriculis dissitis lanceolatis acutis, in margine exteriori incisus et ad basin lobo distincte prominente instructis; patagio anali angustissimo ad coccygem interrupto, calcaneo mediacri suffulto; cauda nulla; corpore unicolore flavescens-fusco.

Istiophorus flavescens. Gray. Zool. Miscell. p. 37.

Ariteus flavescens. Gray. Magaz. of Zool. and Bot. V. II. p. 491.

„ „ Gray. Mammal. of the Brit. Mus. p. 21.