

## Ichthyologische Notizen (X.).

(Schluss.)

Von dem c. M. Dr. Franz Steindachner.

(Mit 3 Tafeln.)

### 1. *Gasterosteus pungitius* Lin.

Wir erhielten durch Herrn Prof. Pančić acht Exemplare dieser zierlichen, variablen Art aus den Sümpfen bei Negotin im östlichen Serbien, es kommt somit der kleine Stichling auch im Stromgebiet der Donau vor.

Nicht minder interessant ist das Vorkommen des *Gobius cephalarges* Pall. in der unteren Donau zwischen Sip und Radujevar und der *Umbrina Kramerii* in den Sümpfen bei Negotin.

### *Parapriacanthus* n. gen.

Sieben Kiemenstrahlen, Körper mäßig gestreckt. Zähne in den Kiefern, am Vomer und auf den Gaumenbeinen sehr fein, spitz; sämtliche Kopfknochen ungezähnt; nur eine Dorsale mit schwachen Stacheln in geringer Zahl; Schuppen festsitzend, stark gezähnt.

### 2. *Parapriacanthus Ransonneti* n. spec.

Taf. I, Fig. 1, 2.

Char. Körperhöhe etwas mehr als 4mal in der Totallänge, Kopflänge unbedeutend mehr als  $3\frac{1}{2}$ mal.

Auge sehr groß, nicht ganz 3mal in der Kopflänge enthalten; Mundspalte lang, schief ansteigend. Kieferzähne sehr klein, spitz, in 2 Reihen, die der Innenreihe etwas länger als die äußeren. Schnauze kurz, Unterkiefer ein wenig vorspringend. Sämtliche Kopfknochen der Außenseite überschuppt. Operkel im hinteren Theile häutig und fein gestreift, groß.