

Gesamtlänge . . . . .	3' 3".
Körperlänge . . . . .	1' 4" 6".
Länge des Schwanzes . . . . .	1' 10" 6".

Vaterland. West-Afrika, Guinea.

### 3. Das senegalische Schuppenthier (*Manis senegalensis*).

*M. longicaudatae similis, ast serie squamarum dorsalium intermedia e 34 squamis composita, caudaque multo brevior, corpore  $\frac{1}{4}$  vel fere  $\frac{1}{3}$  longiore.*

*Manis africana.* Desmar. Nouv. Dict. d'hist. nat. V. XXIV. p. 458. Nr. 1.

„ „ Desmar. Mammal. p. 376. Nr. 595.

„ „ Desmar. Dict. des Sc. nat. V. XXXVII. p. 330.

*Manis tetradactyla.* Fisch. Synops. Mammal. p. 399, 605. Nr. 2.

*Manis longicaudata.* Var.  $\beta$ ? Sundev. Vetensk. Akad. Handl. 1842. p. 251.  $\beta$ .

*Manis tetradactyla.* Gray. Mammal. of the Brit. Mus. p. 188.

*Manis longicaudata.* Wagn. Schreber Säugth. Suppl. B. IV. Abth. I. S. 216. Note 12.

„ „ Focillon. Revue zool. 1850.

*Manis macrura?* Giebel. Säugth. S. 402. Note 4.

*Manis longicauda.* Gray. Proceed. of the Zool. Soc. with Illustr. 1865. p. 363. Nr. 1.

„ „ Gray. Catal. of Carniv. Pachyd. and Edent. Mammal. in the Brit. Mus. p. 367. Nr. 1.

Exemplar. mit verstümmelten Krallen.

*Manis Ceonyx.* Rafin. Ann. gén. des Sc. phys. V. VII. p. 215. Nr. 3.

„ „ Fisch. Synops. Mammal. p. 400. Nr. 2\*.

*Manis longicaudata.* Sundev. Vetensk. Akad. Handl. 1842. p. 251.

*Manis tetradactyla.* Gray. Mammal. of the Brit. Mus. p. 188.

*Manis longicaudata.* Wagn. Schreber Säugth. Suppl. B. IV. Abth. I. S. 216. Note 12.

*Manis macrura.* Giebel. Säugth. S. 402. Note 4.

Desmarest hat dieser Form, welche er mit dem langschwänzigen Schuppenthier (*Manis longicaudata*) für identisch hielt, zuerst erwähnt und dieselbe auch beschrieben, und bald