

finden sich an einigen Punkten ebenfalls nicht selten. Vom Professor Seguenza werden folgende angeführt¹:

Scalaria torulosa Brocc.

Eulimella Scillae Scacchi.

Trochus bullatus Phil.

„ *marginulatus* Phil.

„ *Ottoi* Phil.

„ *filosus* Phil.

„ *glabratus* Phil.

Murex multilamellosus Phil.

Ranella reticularis Lam.

Columbella costulata. Cantr.

Nassa semistriata Brocc.

Emarginula compressa Cantr.

Puncturella noachina Linné.

Dentalium tetragonum Brocc.

„ *ovulum* Phil.

Bulla convoluta Brocc.

Cleodora lanceolata Per. et Lesuer.

Verticordia acuticosta Phil.

Arca aspera Phil.

„ *obliqua* Phil.

„ *pectunculoides* Scacchi.

Limopsis aurita Brocchi.

„ *Reinwardtii* Cantr.

Nucula Polii Phil.

Leda excisa Phil.

„ *pusio* Phil.

„ *cuspidata* Phil.

Pecten scabrellus Lam.

Anomia sulcata Brocc.

Terebratula vitrea Born.

„ *ampulla* Brocc.

Waldheimia peloritana Seg.

„ *euthyra* Phil.

„ *Davidsoniana* Seg.

¹ G. Seguenza. La formation zancleenne etc. pag. 475.