

versehen, deren Rand am Auge angewachsen ist, bald ohne Augenlider.

Der Schultergürtel ist meistens vollkommen ringförmig und bis unter die Rückenhaut vortretend, und die Brustflossen sind sehr oft mit dem Kopfe durch Schädeflossenknorpel verbunden.

1. Fam. *Pristes.*

Rec. Gatt. *Pristis.*

2. Fam. *Rhinobati.*

Rec. Gatt. *Rhinobatus.*

Foss. Gatt. *Spinacorrhinus.*

3. Fam. *Torpedines.*

Rec. Gatt. *Narcine*, — *Torpedo*, — *Astrape*, — *Temera*.

Foss. Gatt. *Narcopterus.*

4. Fam. *Rajae.*

Rec. Gatt. *Raja*, — *Uraptera.*

5. Fam. *Trygones.*

Rec. Gatt. *Trygon*, — *Pteroplatea*, — *Hypolophus*, — *Taeniura*, — *Urolophus*, — *Trygonoptera*, — *Aëtoplatea*, — *Anacanthus*.

Foss. Gatt. *Astrodermus*, — *Cyclarthrus*, — *Euryarthra*.

6. Fam. *Myliobatae.*

Rec. Gatt. *Myliobatis*, — *Aëtobatis*, — *Rhinoptera*, — *Zygodates*,

Foss. Gatt. *Janassa*, — *Ptychacanthus*, — *Pleuracanthus*.

7. Fam. *Cephalopterae.*

Rec. Gatt. *Cephaloptera*, — *Ceratoptera*.

3. Ord. **Rundmäuler (*Cyclostomata*).**

Die Kiemen sind ohne Kiemenbogen unmittelbar an die Wandung abgesonderter offener und an der Hautwand angehefteter Säcke festgewachsen, die mittelst sechs bis sieben besonderer Athmungslöcher oder auch nur eines einzigen gemein-