

3. *Dama*. Geweihe gerundet, an der Spitze länglich-schaufelförmig. Augensprosse und zweite Sprosse spitz. Keine Eckzähne. Nasenkuppe kahl. (*C. Dama*, *C. giganteus*,¹ *C. Palaeodama*,¹ *C. Somonensis*¹.)
4. *Elaphus*. Geweihe gerundet, drei Sprossen nach vorne gerichtet, Spitze gegabelt, Sprossen von einem gemeinschaftlichen Mittelpunkte ausgehend. Thränengruben. Eckzähne bei den Männchen. Nasenkuppe kahl. (*C. Elaphus*, *C. canadensis*, *C. occidentalis*, *C. Wallichii*, *C. americanus*¹.)
5. *Rusa*. Geweihe dreizackig. Augensprosse, keine Mittelsprosse. Die Stange gegen den vorderen oder hinteren Ast aufsteigend, daher zweizackig. Nasenkuppe breit. Thränengruben tief. Eckzähne beim Männchen und bisweilen auch beim Weibchen. Nackenmähne vorhanden. Färbung des Felles meist gesättigt. (*C. Hippelaphus*, *C. unicolor*, *C. Aristotelis*, *C. equinus*, *C. Peronii*, *C. malaccensis*? *C. marianus*.)
6. *Axis*. Geweihe ähnlich wie bei *Rusa*, aber schwächtiger. Keine Eckzähne. Thränengruben klein oder fehlend. Färbung allenthalben weiss gefleckt. Keine Nackenmähne. Schwanz bis zum Hakengelenk reichend. Körpergrösse mittelgross oder klein. (*C. Axis*, *C. porcinus*, *C. Pumilio*.)
7. *Capreolus*. Geweihe ähnlich jenen von *Rusa*; der nach vorwärts gerichtete Ast klein und am oberen Theile der Stange, der obere Ast nach rückwärts gekehrt und eine Gabel bildend, bisweilen auch abgeflacht. Eckzähne und Thränengruben gänzlich, Schwanz beinahe fehlend. (*C. pygargus*, *C. Capreolus*.)
8. *Mazama*. Geweihe fast abgeflacht, bogenförmig gekrümmt, mit der concaven Seite nach vorwärts gekehrt; mit einem einzigen vorderen und inneren Aste, die übrigen rückwärts und meistens senkrecht gestellt. Schwanz lang. Thränengruben eine Hautfalte bildend. Nasenkuppe kahl. Eckzähne fehlend. (*C. virginianus*, *C. mexicanus*, *C. clavatus*, *C. macrotis*, *C. macrurus*, *C. paludosus*, *C. campestris*, *C. nemoralis*.)

¹ Fossil.