

3. *Platyceros*. Geweihe an der Wurzel gerundet, an der Spitze länglich-schauelförmig ausgebreitet, Nase vorne kahl. (*C. Dama*.)

### II. Geweihe gerundet und ästig.

4. *Elaphus*. Nasenkuppe kahl, Thränengruben vorhanden.

a) Geweihe aufrechtstehend, vielästig, drei Äste nach vorwärts gerichtet, Mittelsprosse vorhanden. (*C. Elaphus*, *C. strongyloceros*, *C. Wallichii*.)

b) Geweihe dreiästig, Mittelsprosse fehlend, Fell ungefleckt. (*C. Duvaucelii*, *C. Aristotelis*, *C. equinus*, *C. Kuhlü*, *C. Russa*, *C. marianus*.)

c) Geweihe dreiästig, Mittelsprosse fehlend, Fell mehr oder weniger gefleckt. (*C. Axis*, *C. porcinus*, *C. nudipalpebra*.)

d) Geweihe aufrechtstehend, drei- bis siebenästig, Mittelsprosse fehlend oder veränderlich. (*C. paludosus*, *C. campestris*, *C. macrotis*.)

e) Geweihe nach vorwärts gerichtet und bogenförmig gekrümmt. (*C. virginianus*, *C. leucurus*, *C. mexicanus*, *C. gymnotis*, *C. nemoralis*.)

f) Geweihe tief zweitheilig. (*C. antisiensis*.)

### III. Geweihe kurz und gabelförmig.

5. *Capreolus*. Thränengruben fehlen. (*C. Capreolus*.)

### IV. Geweihe klein und einfach.

6. *Subulo*. Thränengruben klein. (*C. rufus*, *C. simplicicornis*, *C. humilis*?)

### V. Geweihe klein, mit einem einzigen vorderen Aste.

7. *Styllocerus*. Rosenstöcke sehr lang, Eckzähne bei beiden Geschlechtern. (*C. Muntjac*, *C. Reevesi*, *C. Ratwa*.)

Reichenbach, der in seinem grossen Werke „Vollständigste Naturgeschichte des In- und Auslandes“ im III. Bande der Säugethiere, welcher die Wiederkäufer enthält und im Jahre