

Tafel V.

- Fig. 1. *Trypanosyllis zebra* Grube. Zahnkrone im Eingange der Schlundröhre, 250/1.
- Fig. 2. *Pterosyllis lineata* Grube. Kopflappen und Buccalsegment von oben. *x* die flügelartigen Wimperlappen, 70/1.
- „ 2 A „ „ Kopflappen von unten. *p* die nach hinten umgeschlagenen Palpen. *b*. Buccalsegment. *o* Mund, 70/1.
- „ 2 B *Pterosyllis lineata* Grube. Ruder von oben, 70/1.
- „ 2 C „ „ Eine der längsten Borsten, 250/1.
- „ 2 D „ „ Der mit 12 Zähnen bewaffnete Eingang in die Schlundröhre, 500/1.
- Fig. 3. *Pterosyllis plectorhyncha* n. sp. Natürliche Grösse.
- „ 3 „ „ Von oben, 35/1.
- „ 3 A „ „ Kopflappen von unten. *p* die nach hinten umgeschlagenen Palpen, *b*. Buccalsegment, *o* Mund, 70/1.
- „ 3 B „ „ Eine der längsten Borsten, 250/1.
- „ 3 C „ „ Aftersegment und vorletztes Segment. *a c* Aftercirren, 8/1.
- „ 3 D „ „ Der mit 6 Gruppen zu je 3 Zähnen bewaffnete Eingang in die Schlundröhre. Halbe Obensicht, 500/1.

Tafel VI.

- Fig. 1. *Proceraea luxurians* n. sp. Von oben, 70/1.
- „ 1 A „ „ Vorderfläche eines Ruders in Seitenlage, 90/1.
- „ 1 B „ „ Die beiden Formen der Borsten, 500/1.
- „ 1 C „ „ Aftersegment mit den beiden vorhergehenden Segmenten, 70/1.
- „ 1 D „ „ Kopflappen von unten. *o* Mundöffnung, 70/1.
- Fig. 2. *Proceraea brachycephala* n. sp. Von oben, 70/1.
- „ 2 A „ „ Gruppierung der glänzenden Körperchen in der Haut des Rückens.

Tafel VII.

- Fig. 1. *Proceraea luxurians* n. sp. Zahnkrone am Eingange der Schlundröhre 250/1. * 2 Zähne isolirt. 500/1.
- Fig. 2. *Proceraea brachycephala* n. sp. Hinterfläche eines Ruders in Seitenlage. 115/1.