

Die Süßwasserfische des südöstlichen Brasilien (II).

Von dem c. M. Dr. **Franz Steindachner.**

(Mit 6 Tafeln.)

Fam. **CHARACINIDAE** J. Müll.Gruppe: **Anostomatina** Gthr.Gatt. **Anostomus** Gron. Günth.*(Schizodon Agass. Kner.)*1. Art: **Anostomus Knerii** n. sp.

Char. Leibeshöhe $3\frac{1}{2}$ — $3\frac{4}{5}$ mal, Kopflänge $4\frac{1}{2}$ mal in der Körperlänge enthalten. Unterkiefer nur wenig über den Zwischenkiefer vorspringend.

45—46 Schuppen längs der Seitenlinie, 6 Schuppenreihen über und 5 unter derselben bis zur Basis der Ventrals. Zuweilen eine stark verschwommene schwärzliche Binde in der hinteren Längenhälfte des Rumpfes längs der Seitenlinie, vor der Caudale an Breite und Intensivität der Färbung zunehmend: zuweilen nur ein schwärzlicher Fleck auf der Caudalbasis.

D. 12. A. $\frac{3}{8}$. V. 10. L. lat. 45—46. L. transv. $\frac{6}{5}$.

Beschreibung.

Der Kopf ist kurz und ziemlich breit, vorne stark abgestumpft, der Rumpf nur am kurzen Schwanzstiele bedeutend comprimirt.

Die obere Profillinie des Kopfes ist in der Stirngegend mehr oder minder schwach concav, vor derselben an der Schnauze convex.