

Abweichung des beobachteten Intervalles vom Mittel		Differenz zwischen der ersten und zweiten Lesung	
+ 0.3	- 0.4	- 2.0	+ 2.5
0.0	- 0.2	+ 0.5	+ 3.0
+ 0.2	+ 0.2	+ 1.5	+ 1.0
0.0	- 0.3	- 0.5	+ 3.0
- 0.1	0.0	+ 2.0	+ 1.5
0.0	- 0.1	0.0	- 0.5
0.0	- 0.2	+ 3.5	- 0.5
+ 0.1	- 0.1	+ 1.0	+ 1.0
- 0.1	+ 0.2	+ 0.5	+ 2.0
+ 0.3	+ 0.4	0.0	+ 2.0
0.0	+ 0.7	+ 3.0	+ 2.5
- 0.1	0.0	- 1.0	+ 0.5
- 0.1	- 0.3	+ 2.0	0.0
- 0.3	+ 0.5	+ 1.0	+ 1.5

Ich glaube, dass solche Übereinstimmung nichts zu wünschen übrig lässt, und bemerke, dass nur drei sehr excedirende, offenbar verschriebene Beobachtungen hier wegblieden. Das Überwiegen der positiven Differenzen bei den Lesungen hat in Bezug auf die Schärfe der Pointirung keine Bedeutung, und ist nur in anderer Rücksicht näher zu untersuchen.

Schliesslich trage ich Herrn Gustav Starke für die Unermüdlichkeit, mit welcher er die bei solchen ersten Versuchen nicht geringen mechanischen Schwierigkeiten überwinden half, meinen aufrichtigsten Dank ab.