

Familie: *Opatri*. Gattung: *Opatrum* (*sp. sabulosum*) zu Anfang des Frühjahrs am häufigsten, dann allmählig abnehmend, bis zum völligen Verschwinden nach der Mitte Juni.

Familie: *Helopes*. Gattung: *Crypticus* (*sp. glaber*) vom Anfange Juni bis zu Ende August erscheinend und in allmählicher Abnahme begriffen.

Familie: *Mordella*. Gattung: *Mordella*. Vom Anfange Mai bis um die Mitte August; sich vermehrend bis um die Mitte Juni, dann in Verminderung begriffen, Repräsentant: *Mordella aculeata*.

Familie: *Cantharides*. Gattung: *Meloë*. Von der Mitte April bis um die Mitte Mai. Vorherrschend *M. violaceus*.

Familie: *Oedemeræ*. Gattung: *Oedemera*, jährliche Vertheilung wie bei *Mordella*, gemeinste Art *lurida*, erscheint erst zu Ende Mai.

Familie: *Lagriæ*. Gattung: *Lagria* (*sp. hirta*) erscheint im Juli und der ersten Augushälfte.

Familie: *Anthici*. Gattung: *Notoxus* (*sp. monoceros*) kommt vor der Mitte Mai bis zur Mitte September, am häufigsten gegen die Mitte Juni, bis dahin zunehmend, später abnehmend.

Familie: *Stachylini*, kommt mit der Familie der *Carabi*, an Arten-Reichthum und Verbreitung über das ganze Jahr, so wie durch die doppelte Periode des Erscheinens überein. Gattung: *Myrmedonia* kommt vor den ganzen Frühling hindurch, dann wieder von August bis November, die Epochen der beiden Maxima fallen in den März und September. Die Vertheilung wird fast allein durch die gemeine *M. canalicuta* bestimmt. Gattung: *Tachyporus*, ohne auffallend vorherrschende Art, höchstens, *T. hypnorum* ausgenommen, scheint fast zu allen Jahreszeiten durch eine gleiche Individuenzahl vertreten zu sein.

Gattung: *Xantholinus* scheint vorzukommen im März und der ersten Aprilhälfte, dann wieder von Juni bis in den November; eine vorwaltende Art ist wahrscheinlich nicht vorhanden. Die Epochen der Maxima wie bei *Myrmedonia*. Gattung: *Staphylinus*, erscheint von Anfang März bis gegen Ende Juni, dann wieder von August bis November. Vorherrschende Arten sind *S. caesareus* und *murinus*. Gattung: *Ocypus*. Erscheint im Frühjahr, dann in den Monaten August bis October. Die gemeinste Art *O. similis*. Gattung: *Philonthus*. Von März bis um die Mitte Juli,